AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE CUNEO

PORTA IL TUO BAMBINO IN PRONTO SOCCORSO SE…

1. RESPIRA VELOCEMENTE: la pancia va su e giu' velocemente e si vedono rientramenti sotto il collo e al torace.
2. E' POCO REATTIVO: tende ad assopirsi e/o è disorientato; se ha la febbre, rivalutalo dopo un antipiretico come paracetamolo (o ibuprofene)
3. BEVE E URINA TANTO; se invece urina spesso ma poco, rivolgiti al Pediatra di famiglia
4. HA LE PETECCHIE: macchie sulla pelle che non scompaiono dopo la pressione di un dito.
5. E' PALLIDO: guarda le labbra e le mucose degli occhi; se ha appena vomitato, aspetta un po' per rivalutarlo.
6. FEBBRE SOTTO I 3 MESI: specie se rifiuta la poppata o ha un pianto lamentoso.
7. NON SI ALIMENTA: se un lattante nei primi tre mesi di vita mangia solo 20/30 ml per pasto, salta più di un pasto, vomita o rigurgita più del solito;
   - se un lattante oltre i 3 mesi rifiuta di mangiare e bere;
   - per i bimbi più grandi, è invece normale mangiar poco durante uno stato febbrile.
8. MAL DI PANCIA: continuo o ingravescente, con vomito o febbre
9. MAL DI TESTA: se non passa con paracetamolo; se è accompagnato da vomito ripetuto

Non affollare il pronto soccorso per non diffondere il contagio, ma non esitare a venire se il piccolo presenta i segni d'allarme sopraindicati, perché nessun bambino deve essere trascurato a causa dell'emergenza infettiva in corso.