

# SVESTIZIONE STERILE DOPO INTERVENTO CHIRURGICO IN PAZIENTE SOSPETTO O COVID-19 POSITIVO

## Zona dedicata attigua all'uscita della Sala Operatoria



**ATTENZIONE: la fase di DOFFING è ad elevato rischio di autocontaminazione!!!**  
È raccomandato eseguire tutti i passaggi con cautela e sotto la supervisione di un altro operatore



1



Rimuovere il secondo paio di guanti sterili e indossare guanti monouso non sterili

2



Rimuovere i calzari

3a



Rimuovere il camice avvolgendolo su se stesso

Se utilizzate le maniche aggiuntive rimuoverle unitamente a camice e guanti

3b



Se utilizzato, rimuovere grembiule o secondo camice

4



Sostituire guanti monouso

5



Rimuovere schermo facciale e/o occhiali o PAPR

6



Rimuovere il filtro facciale

7



Rimuovere il copricapo

8



Rimuovere il primo paio di guanti sterili

9



Prima di uscire dalla sala indossare guanti monouso non sterili, disinfettare le calzature ed igienizzare nuovamente le mani con gel alcolico

10



Igienizzare mani e braccia con gel alcolico oppure eseguire un lavaggio antiseptico



È raccomandata l'esecuzione di una doccia dopo aver rimosso la divisa

